




Pfizer-BioNTech COVID-19疫苗青少年/成人及兒童劑型比較


品項

成人劑型
(適用:滿12歲以上)

兒童劑型
(適用:滿5歲至11歲)



包裝：49瓶/盒



包裝：10瓶/盒

Pfizer-BioNTech COVID-19疫苗青少年/成人及兒童劑型比較

品項	成人劑型 (適用:滿12歲以上)	兒童劑型 (適用:滿5歲至11歲)
稀釋液	原液0.45 ml +1.8 ml 0.9%無菌生理食鹽水注射液	原液1.3 ml +1.3 ml 0.9%無菌生理食鹽水注射液
劑量	<ul style="list-style-type: none"> 稀釋後 6 doses/vial 每劑抽取 0.3 ml；每劑疫苗含量 30 mcg 抽取疫苗至不足0.3 ml完整劑量，應丟棄該藥瓶與剩餘劑量。 	<ul style="list-style-type: none"> 稀釋後 10 doses/vial 每劑抽取 0.2 ml；每劑疫苗含量 10 mcg 抽取疫苗至不足0.2 ml完整劑量，應丟棄該藥瓶與剩餘劑量
對象	<ul style="list-style-type: none"> 滿12歲以上 ➤ 基礎劑第1、2劑 ➤ 基礎加強劑 ➤ 追加劑 	<p style="text-align: center;"> 成人劑型 兒童劑型 </p>  <ul style="list-style-type: none"> 滿5歲至11歲 ➤ 基礎劑第1、2劑

兒童及青少年(5歲至17歲)接種作業COVID-19疫苗

疫苗種類	Moderna COVID-19疫苗	Pfizer-BioNTech COVID-19疫苗 兒童劑型	Pfizer-BioNTech COVID-19疫苗 成人劑型	
對象*	滿6歲以上	滿5歲至11歲	滿12歲以上	
劑量	<ul style="list-style-type: none"> 滿6-11歲：0.25 ml/劑(50 mcg) 滿12歲以上：0.5 ml/劑(100 mcg) 	0.9%無菌生理食鹽水注射液 使用1.3 ml 進行稀釋	0.9%無菌生理食鹽水注射液 使用1.8 ml進行稀釋	
適用接種劑次	<ul style="list-style-type: none"> 滿6歲-11歲 ➤ 基礎劑第1、2劑 (間隔12週) 	<ul style="list-style-type: none"> 滿12歲至17歲 ➤ 基礎劑1、2劑 (間隔12週) ➤ 基礎加強劑(8大類對象，與第2劑間隔至少28天) 	<ul style="list-style-type: none"> 滿5歲至11歲 ➤ 基礎劑第1、2劑(間隔12週) 	<ul style="list-style-type: none"> 滿12歲至17歲 ➤ 基礎劑第1、2劑(間隔12週) ➤ 基礎加強劑(8大類對象，與第2劑間隔至少28天) ➤ 追加劑(與前一劑次間隔至少5個月(150天))
(年齡範例*)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 105年(含)以前出生 111年5月25日接種，須為105年5月25日(含)以前出生 		<ul style="list-style-type: none"> ➤ 106年(含)以前出生 111年5月25日接種，須為106年5月25日(含)以前出生 ➤ 99年(含)以前出生 111年5月25日接種，須為99年5月25日(含)以前出生 	

*註：核對出生年月日足歲